



Географски и метеоролошки подаци *Geographical and meteorological data*

Методолошка објашњења

ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о географским координатама, површини и дужини граница преузети су од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подаци о надморским висинама планинских врхова и језерима и рибањацима од Природно-математичког факултета Бања Лука, а подаци о ријекама од Агенције за воде обласног ријечног слива Саве.

Обухватност и упоредивост података

Податак о површини Републике Српске (24 858 km²)¹⁾ је привремени податак који укључује и дио Брчко дистрикта. Коначна површина биће утврђена након усаглашавања ентитетске линије разграничења и усаглашавања међународне границе БиХ. Раније објављени подаци су израчунавани коришћењем поларног планиметра, док су подаци објављени у овом броју добијени векторизацијом катастарских планова. Дужину граница, такође, треба условно користити¹⁾.

Територија Републике Српске налази се између 42°33' и 45°16' сјеверне географске ширине и 16°13' и 19°38' источне географске дужине, односно захвата сјеверни и источни дио геопростора Босне и Херцеговине. Република Српска има површину од 24 858 km².

Република Српска спада у групу континенталних простора – нема излаз на море. Смјештена на контакту двију великих природно-географских и друштвено-економских регионалних цјелина – панонске и медитеранске, и представља спону Панонског и Јадранског басена.

Дефиниције

Под појмом **планина** подразумева се узвишење изнад 500 м надморске висине, док се узвишења од 200 до 500 м називају брда. Планине су поредане према висини врхова.

У геоморфолошком изгледу на простору Републике Српске се смјењују различити облици. У сјеверном перипанонском дијелу брежуљкасти терени, изграђени од кенозојских наслага, постепено се спуштају у равничарске просторе са алувијалним заравнима и ријечним терасама који уједно чини и најплоднији дио Републике Српске. На том простору издижу се само неколико усамљених планина – Козара, Просара, Мотајица, Вучијак, Озрен и Требовац, те крајњи сјеверо-источни огранци Мајевике. Према југу равничарски простор преко брежуљкастог терена прелази у планинско подручје које заузима и највећи дио површине Републике Српске. Највећи планински врх у Републици Српској је Маглић, који се налази на 2 386 метара надморске висине на истоименој планини.

¹⁾ Дужина границе (међуентитетска и државна) и површина Републике Српске су тренутни оперативни подаци које користи РУГИПП што не значи да су и коначни, јер међуентитетска линија никада није дефинитивно потврђена на терену, тако да ти подаци још увијек имају неслужбен карактер.

Methodological explanations

GEOGRAPHICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on geographical coordinates, surface area and length of boundaries were taken over from the Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs, data on mountain peaks' height above sea level, as well as data on lakes and fishponds, from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics Banja Luka, while data on rivers were obtained from the Water Agency for Sava River District.

Coverage and comparability of data

Data on the surface area of Republika Srpska (24 858 km²)¹⁾ is temporary and includes the portion of Brčko District. Final surface area will be determined after reaching the agreement on entity borderline and on international border of BH. Previously published data were calculated by using polar planimeter, while the data published in this issue are obtained by vectorisation of the cadastre plans. Length of boundaries should also be used conditionally.

The latitude and longitude of the territory of Republika Srpska are between 42°33'N and 45°16'N, and 16°13'E and 19°38'E, respectively, that is, its territory covers northern and eastern parts of the geographical area of Bosnia and Herzegovina. The surface area of Republika Srpska is 24 858 km².

Republika Srpska belongs to the group of continental areas – it has no access to the sea. Republika Srpska is located at the meeting point of two large natural geographic and socio-economic regional units – Pannonian and Mediterranean. It is a link between the Pannonian Basin and Adriatic Basin.

Definitions

The term **mountain** refers to any elevation with height above sea level over 500 m, while elevations with height above sea level between 200 and 500 m are called hills. Mountains are listed by height of their peaks.

The geomorphology of the territory of Republika Srpska abounds in different forms. In the northern, Peri-Pannonian part, the hilly terrain composed of Cenozoic deposits gradually descends to the flat land with alluvial plateaus and fluvial terraces, which is also the most fertile area in Republika Srpska. There are only a few scattered mountains in this area – Kozara, Prosara, Motajica, Vucijak, Ozren and Trebovac, as well as the furthestmost northeastern slopes of Majejica. Towards the south, the flat land gradually turns first into the hilly terrain and then into the mountainous region which covers the largest portion of the territory of Republika Srpska. The highest mountain peak in Republika Srpska is Maglic, located at 2 386 metres above sea level, on the mountain also named Maglic.

¹⁾ Length of borders (inter-entity boundary line and state border) and surface area of Republika Srpska are current operational data used by the Republic Administration for Geodetic and Property-Legal Affairs, which does not mean that these data are final, because the inter-entity boundary line was never officially verified on field, so these data are still unofficial.

Под **дужином ријеке** подразумијева се дужина тока који се појављује под наведеним именом без притока или ријека од којих настаје.

Највеће ријеке Републике Српске су Дрина (305 km), Сава (202 km) и Врбас (117 km) које припадају **црноморском** ријечном сливу. Све мање ријеке у Републици Српској, осим оних на подручју Источне Херцеговине, припадају дринском и савском ријечном сливу. Све воде јужно од планинског превоја Чемерно, на подручју Источне Херцеговине припадају **јадранском** ријечном сливу (Требишњица, Неретва). Поред Дрине и Саве, веће ријеке у Републици Српској су Врбас, Босна и Требишњица.

Језера Републике Српске су копнене насlage воде у површинским удубљењима на територији Републике Српске. Највеће језеро Републике Српске је Билећко језеро (на Требишњици) површине 27,064 km² које је и највеће вјештачко језеро на Балканском полуострву. Највеће природно језеро је Штиринско (на Зеленгори) површине 0,129 km².

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о земљотресима, температури ваздуха, количини падавина и водостају ријека преузети су од Републичког хидро-метеоролошког завода, који врши и осматрање, мјерење и прикупљање ових података преко мреже станица.

Обухватност и упоредивост података

Мрежу метеоролошких станица у 2010. години чиниле су 22 станице, са метеоролошким подацима.

Дефиниције

Средња мјесечна температура ваздуха израчуната је као мјесечни просјек средњих дневних температура ваздуха, а које су добијене на основу мјерења сваког дана у 7.00, 14.00 и 21.00 час, по локалном времену, према формули:

$$\frac{t_7 + t_{14} + 2 t_{21}}{4}$$

Средња годишња температура ваздуха је израчуната на исти начин, тј. као мјесечни просјек.

Број дана са **кишом и сњежним покривачем** представљају дане у којима су назначене појаве износиле најмање 0,1 mm за кишне и најмање 1 cm за снјеж.

Подаци о **облачности** добијени су мјерењем у десетинама покривености неба облацима, помоћу скале од 0–10 у којој 0 означава потпуну ведрину, а 10 потпуну облачност.

Подаци о **падавинама** изражени су у милиметрима (mm или l/m²), а мјере се у 7.00 часова.

Климатске карактеристике

Различити климатски утицаји, који дјелују на простору Републике Српске, су резултат природних фактора и законитости опште циркулације ваздушних маса овог простора. Према томе, на територији Републике Српске могу се издвојити три климатска типа и то:

1. Сјеверни перипанонски простор, који има умјерено континенталну климу,
2. Планинска и планинско-котлинска клима,
3. Измјењена варијанта медитеранске – јадранске климе.

River length refers to the length of flow which appears under a given name, excluding tributaries and rivers which form the flow.

The longest rivers in Republika Srpska are Drina (305 km), Sava (202 km), and Vrbas (117 km), and these belong to the **Black Sea drainage basin**. All smaller rivers in Republika Srpska, excluding those in Eastern Herzegovina, belong to the Drina river basin and Sava river basin. All waters south of the mountain pass Čemerno, in Eastern Herzegovina, belong to the **Adriatic drainage basin** (Trebišnjica, Neretva). In addition to Drina and Sava, big rivers in Republika Srpska are also Vrbas, Bosna, and Trebišnjica.

Lakes in Republika Srpska are the inland water deposits filling the surface basins on the territory of Republika Srpska. The largest lake in Republika Srpska is Bilećko (on Trebišnjica), with the square area of 27 064 km², and this lake is also the largest artificial lake in the Balkan Peninsula. The largest natural lake is Štirinsko (on the mountain Zelengora), with the square area of 129 km².

METEOROLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on earthquakes, air temperature, precipitation and rivers water level are obtained from the Republic Hydrometeorological Service which performs observation, measuring and collection of these data through the network of stations.

Coverage and comparability of data

Network of meteorological stations in 2010 covered 22 stations, with meteorological data.

Definitions

Average monthly air temperature is calculated as the monthly average of mean daily air temperatures obtained on the basis of daily measuring, at 7 am, 2 pm and at 9 pm, local time, according to the equation:

Average annual air temperature is calculated using the same method, i.e. as the monthly average.

Number of days with rain or snow are days during which these given phenomena amounted to at least 0.1 mm for days with rain, and at least 1cm for snow.

Data on cloudiness are obtained by measuring in tenths of cloud coverage of the sky with the scale from 0 to 10, in which 0 means completely fair weather, and 10 complete cloudiness.

Data on **precipitation** are given in millimetres (mm or l/m²), and these are measured at 7 am.

Climatic characteristics

Various climatic influences in force on the territory of Republika Srpska are the result of natural factors and the rules of general circulation of air masses in this region. Thus, there are three climate types on the territory of Republika Srpska, and these are:

1. Northern Peri-Pannonian region, with its moderate continental climate,
2. Alpine and Pannonian climate,
3. Modified Mediterranean – Adriatic climate.

Климатске карактеристике перипанонског простора

Одликују се умјерено хладним зимама и топлим љетима. Вриједност средње годишње температуре ваздуха овог климатског типа креће се од 12° до 19°C.

Средња мјесечна температура ваздуха најтоплијег мјесеца - јула, има вриједности од 21° до 23°C. Средња мјесечна температура најхладнијег мјесеца јануара, креће се од -0.2° до -0.9°C. Апсолутна максимална температура ваздуха достиже вриједност до 41°C, док апсолутна минимална и до -30°C, што нас упућује на закључак да су годишње температурне амплитуде високе и имају вриједности и до 71°C. У просјеку годишња количина падавина има вриједност од 1 050 l/m² на западу до 750 l/m² на истоку. Количина падавина идући од запада према истоку опада, али су падавине у току година добро распоређене. Овај простор у току године има око 1 900 сунчаних часова. На крајњем истоку перипанонског простора у зимском периоду дува кошава, хладан и слаповит вјетар. Остали вјетрови, који дувају у овом поднебљу, настају као последица тренутне циркулације ваздушних маса.

Планинска и планинско-котлинска клима

Захвата највећи дио Републике Српске. Планински масиви одликују се кратким и свјезим љетима и хладним и сњеговитим зимама, гдје су висине снијеговог покривача високе, а снијегни покривач се дуго задржава.

Средња годишња температура ваздуха је између 5° и 7°C, средња мјесечна температура ваздуха најхладнијег мјесеца – јануара има вриједности од 2.5° до -3°C. Апсолутне минималне температуре достижу вриједности преко -30°C, док се апсолутне максималне температуре ваздуха пењу и до 35°C. Из овог је видљиво да су температурне амплитуде високе.

Годишња сума падавина је изнад 1 200 l/m². Број сунчаних часова је око 1 850 на годишњем нивоу. Брежуљкаста подручја те котлине и долине имају нешто блажу климу. Простори који имају обиљежја планинско- котлинске климе имају средњу годишњу температуру ваздуха око 10°C, количина падавина на годишњем нивоу креће се од 700 до 1 000 l/m².

Зиме су умјерено хладне са снијегом, са честим температурним инверзијама и маглама, док су љета умјерено топла.

Измјењена варијанта јадранске климе

Јужни дио Републике Српске односно простор ниске Херцеговине има измијењену варијанту јадранске климе, овај простор се назива Хумине, за разлику од простора Рудина, који захвата више планинске дијелове херцеговачког крша, који се у климатском погледу одликује прелазном варијантом између климе Хумина и планинске климе.

Клима Хумина и Рудина

Одликује се ослабљеним утицајем Јадранског мора. Љета су врло топла са око 2 400 часова трајања сијања Сунца. Средња годишња температура ваздуха је између 14° и 14.7°C. Апсолутна максимална температура ваздуха достиже 41° подиок на термометру, док апсолутна минимална температура има негативан предзнак и достиже вриједност од -8°C.

Сума падавина креће се од 1 500 до 2 000 l/m², распоред падавина је неповољан, јесен и зима имају највећу, а љето најмању количину падавина, када се јављају суше. За ове просторе карактеристични су вјетрови бура и југо. Бура је слаповит вјетар сјеверног и сјевероисточног правца, дува у зимском дијелу године, често достиже олујну јачину. Југо дува када се над Африком јави висок, а над Јадранским морем низак ваздушни притисак, дува током читаве године, обично доноси кишу. У овом климатском простору смјештен је најтоплији град Републике Српске, Требиње. За разлику од климе Хумина, климатске карактеристике климе Рудина одликују се нижим љетним и зимским температурама, у зимском периоду снијегне падавине су редовна појава.

Climatic characteristics of the Peri – Pannonian region

This region's climate is characterised by moderately cold winters and warm summers. Average annual air temperature ranges for this climate type are from 12° to 19°C.

Average monthly air temperature ranges in the warmest month, July, are from 21° to 23°C. Average monthly air temperature ranges in the coldest month, January, are from -0.9° to -0.2°C. The absolute maximum air temperature is 41°C, while the absolute minimum temperature is -30°C, which leads to the conclusion that annual temperature amplitude is high, with the highest value of 71°C. Average amount of precipitation has the value of 1 050 l/m² in the west, and 750 l/m² in the east. Precipitation amount decreases from the west to the east, but the precipitation throughout the year is well distributed. Throughout the year, this region has around 1 900 sunshine hours. Košava, a cold and squally wind, blows in the far east of the Peri-Pannonian region during winter. Other winds blowing in this region result from the current circulation of air masses.

Alpine and Pannonian climate

This climate covers the largest part of Republika Srpska. Mountain ranges are characterized by short and cool summers, and cold and snowy winters, with high snow cover which persists for a long time.

Average annual air temperature is between 5° and 7°C, while for the coldest month – January the average monthly air temperature is between 2.5° and -3°C. The absolute minimum temperature is below -30°C, and the absolute maximum temperature is up to 35°C. Therefore, temperature amplitude for this region is high.

Annual precipitation sum is over 1 200 l/m². Annually, there are approximately 1 850 sunshine hours. Hilly terrain, as well as hollows and valleys are characterised by a somewhat milder climate. Average annual air temperature in the areas with the Alpine and Pannonian climate is around 10°C. Precipitation amount on the annual level is between 700 and 1 000 l/m².

Winters are moderately cold, with snow, common temperature inversions and fog. Summers are moderately warm.

Modified Adriatic climate

The southern region of Republika Srpska, also known as lower Herzegovina, is characterised by the modified Adriatic climate, and this region is called Humine, as opposed to the region called Rudine, which covers higher mountainous parts of the karst of Herzegovina, and is characterised by a variant of both the Alpine climate and the climate of Humine.

Climate of Humine and Rudine

This climate type is characterised by the impact of the Adriatic Sea. Summers are very warm, with approximately 2 400 sunshine hours. Average annual air temperature is between 14° and 14.7°C. The absolute maximum temperature is 41°C, while the absolute minimum temperature goes below zero, and its lowest value is -8°C.

Precipitation sum is between 1 500 and 2 000 l/m², with precipitation not being well distributed, since autumns and winters have the highest amount of precipitation, while summers bring droughts, having the lowest amount of precipitation. This region is characterised by north-eastern wind called "bura" and south wind called "jugo". "Bura" is a squally north and north-eastern wind which blows during winter, often reaching storm force. "Jugo" blows when there is high air pressure over Africa, and low air pressure over the Adriatic Sea. It blows throughout the year, and usually brings rain. Trebinje, the warmest city in Republika Srpska, is located in this region. Unlike Humine climate, Rudine climate is characterised by lower temperatures during both summer and winter, with snow being a regular occurrence during winter.

ГИДРОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о нивоу и квалитету вода преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода, који врши мјерење и прикупљање ових података а дати су на основу дневних осматрања и изражени су у центиметрима (cm).

Обухватност и упоредивост података

Мрежу хидролошких станица у Републици Српској крајем 2010. године чинило је 18 станица, од којих низ података (Х-водостај) има 12 станица. Број станица за квалитет воде је двије, а број аутоматских станица које имају низ је четири (тренутно раде четири станице).

Дефиниције

Водомјерна летва (водомјер) је фиксни мјерни уређај стандардних димензија са скалом на којој се, са тачношћу ± 1 cm, може прочитати водостај.

Водостај је вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомјера, изражено у центиметрима, са предзнаком "-" ако је ниво воде нижи од нулте тачке. Подаци о водостају ријека односе се на најважније ријеке Републике Српске и водомјерне станице за које постоје подаци у временском слиједу од десет година.

Протицај воде је запремина воде која протекне кроз попречни профил водотока у јединици времена и изражава се у m^3/s или l/s .

СЕИЗМОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци о земљотресима преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода, који врши осматрање, мјерење и прикупљање ових података преко мреже сеизмолошких станица.

Обухватност и упоредивост података

Мрежа сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода у 1996. години није постојала. Републички хидрометеоролошки завод је опсервирао податке само са једне аналогне сеизмолошке станице која се налазила у Бањалуци. Мрежа сеизмолошких станица 2010. године обухвата шест дигиталних аутоматских сеизмолошких станица на простору Републике Српске, постављене на локацијама које задовољавају неопходан просторни распоред за лоцирање земљотреса.

Дефиниције

Земљотрес представља комплексну природну појаву. Настаје изненадним ломом у стијенској маси, под дејством напона створеног тектонским притисцима који се акумулирају дуготрајним геодинамичким процесима. Лом стијене започиње у моменту када напони превазиђу физичку чврстоћу стијене, при чему се значајан дио тако акумулиране енергије, ослобађа у облику еластичне деформације, тј. појавом расједа (пукотине) у стијени, а остатак енергије се емитује у облику еластичних сеизмичких таласа.

Хипоцентрално вријеме представља вријеме почетка лома стијенске масе у хипоцентру.

Магнитуда земљотреса представља количину ослобођене енергије у хипоцентру (жаришту земљотреса). Дефинисана је емпиријском логаритамском функцијом и представља неименован број. Скала магнитуде отворена је и са доње и са горње стране, мада се уобичајене вриједности налазе у границама од 1 до 9. У част сеизмолога Рихтера (Charles Richter) који је 1935. године математички дефинисао магнитуду као енергетску мјеру догођеног земљотреса, овај параметар земљотреса се назива и Рихтерова магнитуда. За разлику од интензитета величина магнитуда не зависи од дубине хипоцентра.

HYDROLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on water level and quality were taken over from the Republic Hydrometeorological Service which measures and collects these data, and they are provided on the basis of daily observations, expressed in centimetres (cm).

Coverage and comparability of data

Network of hydrological stations in Republika Srpska, at the end of 2010, consisted of 18 stations, of which 12 stations have the data series (H-water level). The number of stations for water quality is two, while the number of automatic stations which dispose of the series is four (currently, four stations are working).

Definitions

Staff gage (water metre) is a fixed measurement device of standard dimensions, with a scale on which, with accuracy of ± 1 cm, water level can be observed.

Water level refers to vertical distance from water mirror level to the zero point on the staff gage scale, expressed in centimetres, with the sign "-" if water level is below the zero point. The data on water level refer to the most important rivers in Republika Srpska and those water meter stations for which data are available in a time sequence of ten years.

Water flow refers to water volume which flows through cross section of water current in a unit of time, and it is expressed in m^3/s or l/s .

SEISMOLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data on earthquakes were taken over from the Republic Hydrometeorological Service which carries out observation, measuring and collection of these data through the network of seismological stations.

Coverage and comparability of data

Seismological stations network of the Republic Hydrometeorological Service did not exist in 1996. Republic Hydrometeorological Service observed data only through one analogue seismological station situated in Banja Luka. In 2010, seismological stations network comprised six digital automatic seismological stations on the territory of Republika Srpska, situated on locations which comply with the necessary territorial arrangement for locating earthquakes.

Definitions

An earthquake is a complex natural phenomenon. It appears as the result of a sudden disruption in the rock mass, under the influence of strain created by tectonic pressures stored through long lasting geodynamic processes. Rock disruption begins at the moment when strain prevails over physical solidity of the rock, during which a significant part of stored energy is released as elastic deformation, i.e. by emergence of rifts (cracks) within the rock, while the rest of the energy is released as elastic seismic waves.

Hypocentral time refers to the time of commencement of rock mass disruption in the hypocentre.

Earthquake magnitude refers to the amount of energy released in the hypocentre (earthquake's focus). It is defined using the empirical logarithmic function, and it is an unnamed number. Magnitude scale is open on both upper and bottom side, even though common values are between 1 and 9. In honour of Charles Richter, a seismologist who, in 1935, mathematically defined the magnitude as energetic measure of the earthquake, this parametre is also called the Richter magnitude. Unlike intensity, magnitude does not depend on the hypocentre depth.

Интензитет земљотреса представља ефекат оштећења које земљотрес произведе на површини Земље. Значајно зависи од дубине хипоцентра (дубљи хипоцентар са истом магнитудом значи мањи интензитет на површини тла и обрнуто). Процењује се према једној од међународних скала. Код нас најчешће коришћена је Меркали-Канкани-Зибергова (Merkalli-Cancani-Sieberg) дванаестостелена скала (MCS). Степени су одређени према утицају земљотреса на људе, грађевине и природу. Наведени су земљотреси који имају епицентар на територији Републике Српске.

ЕКОЛОШКИ ПОДАЦИ

Извори и методе прикупљања података

Подаци – индикатори квалитета ваздуха, преузети су од Републичког хидрометеоролошког завода који врши мјерење и прикупљање ових података путем мреже мониторинга квалитета ваздуха.

Обухватност и упоредивост података

Мјерења компоненти загађености ваздуха у Републичком хидрометеоролошком заводу се тренутно врше на метеоролошком опсерваторијуму (географска ширина 44° 47', географска дужина 17° 13', надморска висина 153 м) гдје се континуирано мјере имисионе концентрације SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀ стационарним еколошким лабораторијем.

За оцјену квалитета ваздуха врше се мјерења рН вриједности и електричне проводљивости падавина.

Киселе кише настају када се слободни неметални оксиди сумпора и азота вежу са воденом паром у атмосфери и падају на земљу.

Киселе кише представљају један од главних узрока одумирања шума јер се сумпор диоксид у једињењу са водом претвара у сумпорну киселину која има погубно дјеловање на читаву флору. Сумпорна киселина има негативно дјеловање нарочито на биљке јер ремети процес фотосинтезе што има за посљедицу оштећење лишћа и одумирање шума. Киселина отапа хранљиве састојке који су биљкама потребни за изградњу њихових станица и доспијева у коријење и лишће оштећујући њихова ткива.

Осим за биљке киселе кише озбиљно загађују и воде којима се драстично смањује рН вриједност. Велико смањење рН вриједности доводи до изумирања микроорганизама, а јавља се и проблем питке воде.

Управо загађење вода представља највећи проблем. Загађење из ваздуха киселим кишима преноси се до земље и слива се у површинске и подземне водене токове. Киселе кише су један од главних разлога смањења залиха питке воде на свјетском нивоу и као такве представљају озбиљан проблем.

Дефиниције

Животна средина подразумева компоненте животне средине, одређене системе, процесе и структуру животне средине.

Загађивање подразумева директно или индиректно увођење, као резултат људске активности, супстанци, вибрација, топлоте, мириса или буке у ваздуху, води или земљишту, које могу бити штетне по здравље човјека или имовину, или квалитет живота у животnoj средини.

Заштита животне средине подразумева све одговарајуће дјелатности и мјере које имају за циљ превенцију од опасности, штете или загађивања животне средине, смањење или отклањање штете која је настала, поврат на стање прије изазване штете.

Мониторинг квалитета ваздуха јесте систематско праћење физичко-хемијског састава ваздуха и падавина, укључујући атмосферски озон, радиоактивност ваздуха и падавина и одређивање садржаја загађујућих материја у атмосфери, користећи инструментална мјерења стања атмосфере, хемијске анализе и атмосферске нумеричке симулационе и прогностичке моделе.

Earthquake intensity refers to the effect of damage an earthquake causes on the Earth's surface. It is significantly dependant on depth of the hypocentre (deeper hypocentre with the same magnitude means lower intensity on the surface, and vice versa). It is estimated using one of the international scales. In Republika Srpska, twelve-degree Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) scale is most commonly used. The degrees are determined according to the impact of the earthquake on people, buildings and nature. Here, earthquakes with the epicentre on the territory of Republika Srpska are covered.

ECOLOGICAL DATA

Sources and methods of data collection

Data – indicators of air quality were taken over from the Republic Hydrometeorological Service which carries out measuring and collection of these data through the network of air quality monitors.

Coverage and comparability of data

In the Republic Hydrometeorological Service, measuring of air pollution components is currently done in the meteorological observatory (latitude 44° 47', longitude 17° 13', elevation 153m), where emission concentrations of SO₂, CO, NO, NO₂, NO_x, O₃, PM₁₀ are continually measured through the set ecological laboratory.

For evaluation of air quality, measuring of pH values and electrical conductivity of precipitations is carried out.

Acid rain is the result of free sulphur and nitrogen non-metallic oxides reacting with water vapour in the atmosphere and falling to the ground.

Acid rain is one of the main causes of forests dying off, because sulphur dioxide reacts with the water molecules in the atmosphere to produce sulphuric acid which has a disastrous effect on the entire flora. Sulphuric acid has a particularly negative impact on plants, because it disrupts photosynthesis, which results in damage to leaves and leads to forests dying off. The acid dissolves the nutrients plants require for cell building, while also reaching roots and leaves, damaging their tissue.

In addition to the damage it causes to plants, acid rain can also pollute the water, drastically lowering its pH value. Significantly lowered pH value leads to extinction of microorganisms, with drinking water arising as another issue.

It is exactly this water pollution that represents the main problem. Acid rain transfers pollution from the air to the soil and flows towards surface and ground water flows. Acid rain is one of the main reasons for reduced drinking water supplies all over the world, and as such represents a severe problem.

Definitions

Environment refers to components of environment, specific systems, processes and structure of environment.

Pollution refers to direct or indirect introduction, as a result of human activity, of substances, vibrations, heat, smells or noise into the air, water or soil, and these can be harmful to man's health, property, as well as to quality of life in the environment.

Environment protection refers to all adequate activities and measures aimed at prevention of danger, damage or pollution in the environment, decrease or elimination of damage already done, and recovery to the state as it was before the damage was done.

Air quality monitoring refers to systematic following of physical and chemical properties of air and precipitations, including atmospheric ozone, radioactivity of air and precipitations, as well as determination of content of polluting substances in atmosphere, using instrumental measuring of atmosphere states, chemical analysis and atmospheric numeric simulation and prognostic models.

Мјерење је скуп поступака којима се одређује вриједност показатеља квалитета ваздуха и/или посредних показатеља квалитета ваздуха.

Показатељ квалитета ваздуха је мјерљива величина неког хемијског елемента и/или споја, односно физичког стања и/или појаве, који узрокује промјену квалитета ваздуха.

Посредни показатељ квалитета ваздуха је мјерљива величина којом се запажа промјена на биљкама, грађевинама и у биолошким налазима који указује на учинак загађеног ваздуха.

Густоћа мјерења је број мјерних резултата појединог показатеља квалитета ваздуха и/или посредних показатеља квалитета ваздуха у јединици времена.

Measuring is a set of procedures for determining value of air quality indicators and/or indirect air quality indicators.

Air quality indicator is measurable quantity of certain chemical element and/or compound, that is, physical state or occurrence, which causes change of air quality.

Indirect air quality indicator is measurable quantity used to mark changes on plants, buildings and in biological finds, indicating the influence of polluted air.

Measuring frequency is a number of measuring results of a specific air quality indicator and/or indirect air quality indicators in a unit of time.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Годишње публикације: Ово је Република Српска
Статистички годишњак Републике Српске

PUBLISHING

Annual publications: This is Republika Srpska
Statistical Yearbook of Republika Srpska

2.1. Географске координате крајњих тачака Републике Српске
Geographical coordinates of the extreme points of Republika Srpska

	Сјеверна географска ширина <i>North geographical latitude</i>	Источна географска дужина ¹⁾ <i>East geographical longitude¹⁾</i>	Општина <i>Municipality</i>	Насељено мјесто <i>Settlement</i>	
Сјевер	45° 16'	16° 56'	Козарска Дубица <i>Kozarska Dubica</i>	Средина ријеке Саве – 1 км сјеверозападно од насеља Градина Доња <i>Middle of the river Sava – 1 km north-east of the settlement Gradina Donja</i>	North
Југ	42° 33'	18° 27'	Требиње <i>Trebinje</i>	5 км јужно од насеља Граб <i>5 km south of the settlement Grab</i>	South
Исток	44° 03'	19° 38'	Братунац <i>Bratunac</i>	4 км сјевероисточно од мјеста Жлијебач <i>4 km south-east of the settlement Žlijebac</i>	East
Запад	44° 57'	16° 13'	Крупа на Уни <i>Krupa na Uni</i>	Караново Брдо код насељеног мјеста Средњи Бушевић <i>Karanovo Brdo near the settlement Srednji Bušević</i>	West

¹⁾ По Гриничу / *In GMT*

Извор: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Source: Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs

2.2. Дужина граница и површина Републике Српске¹⁾
Length of boundaries and surface area of Republika Srpska¹⁾

Површина, укупно <i>Surface area, total</i> km ²	Границе <i>Borders</i>														
	укупно <i>total</i>		Црна Гора <i>Montenegro</i>		Србија <i>Serbia</i>		Хрватска <i>Croatia</i>		међуентитетска линија разграничења <i>entity border line</i>						
	m	km	m	km	m	km	m	km	m	km					
24 858	2 103	475	2 103	258	706	259	370	115	370	308	839	309	1 165	815	1 166

¹⁾ Видјети методолошка објашњења / *See methodological explanations*

Извор: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Source: Republic Administration for Geodetic and Proprietary-Legal Affairs

2.3. Језера и рибњази
Lakes and fishponds

	Површина, km ² <i>Area, km²</i>	Надморска висина, m <i>Height above sea level, m</i>	Највећа дубина, m <i>Maximum depth, m</i>	Запремина воде, мил. m ³ <i>Water volume, mil. m³</i>	
ВЈЕШТАЧКА ЈЕЗЕРА					ARTIFICIAL LAKES
Билећко (на Требишњици)	27,064	400	104	1 280	<i>Bilećko (at Trebišnjica)</i>
Перућачко (на Дрини)	12,401	290	70	355	<i>Perućačko (at Drina)</i>
Зворничко (на Дрини)	8,876	140	28	89	<i>Zvorničko (at Drina)</i>
Вишеградско (на Дрини)	8,9	336	78	161	<i>Višegradsko (at Drina)</i>
Боцац (на Врбасу)	2,33	282	62	52,7	<i>Boćac (at Vrbas)</i>
Горица (на Требишњици)	1,082	320	33	15	<i>Gorica (at Trebišnjica)</i>
Дренова (на Вијаки)	0,348	170	12	9,5	<i>Drenova (at Vijaka)</i>
Клиње (на Мушници)	0,252	1 030	25	1,7	<i>Klinje (at Mušnica)</i>
ПРИРОДНА ЈЕЗЕРА					NATURAL LAKES
Штиринско (на Зеленгори)	0,129	1 672	4,5	0,255	<i>Štirinsko (at Zelengora)</i>
Котланичко (на Зеленгори)	0,044	1 528	10	0,25	<i>Kotlaničko (at Zelengora)</i>
Улошко (на Црвњу)	0,043	1 058	14	0,255	<i>Uloško (at Crvanj)</i>
Доње Баре (на Зеленгори)	0,021	1 475	4,5	0,057	<i>Donje Bare (at Zelengora)</i>
Орловачко (на Зеленгори)	0,021	1 438	5	0,054	<i>Orlovačko (at Zelengora)</i>
Кладополско (на Зеленгори)	0,016	1 382	9	0,052	<i>Kladopoljsko (at Zelengora)</i>
Црно (на Зеленгори)	0,012	1 440	3	0,015	<i>Crno (at Zelengora)</i>
Горње Баре (на Зеленгори)	0,008	1 515	2	0,006	<i>Gornje Bare (at Zelengora)</i>
Бијело (на Зеленгори)	0,006	1 416	3		<i>Bijelo (at Zelengora)</i>
РИБЊАЦИ					FISHPONDS
Санџани (на Гомјеници)	11,179	143	4,0	...	<i>Saničani (at Gomjenica)</i>
Бардача (на Матури)	7,472	90	2,2	...	<i>Bardača (at Matura)</i>
Прњавор (на Вијаки)	6,664	134	3,5	...	<i>Prnjavor (at Vijaka)</i>
Сјековац (на Укрини)	3,98	85	3,0	...	<i>Sjekovac (at Ukrina)</i>

Извор: Природно-математички факултет Бања Лука, Катедра за физичку географију
Source: Faculty of Natural Sciences and Mathematics Banja Luka, Department for Physical Geography

2.4. Планине и планински врхови¹⁾
 Mountains and mountain peaks¹⁾

Планина	Врх	Надморска висина, m Height above sea level, m	Peak	Mountain
Маглић	Маглић	2 386	Maglič	Maglič
Волујак	Волујак	2 336	Volujak	Volujak
Лелија	Велика Лелија	2 032	Velika Lelija	Lelija
Зеленгора	Брегоч	2 014	Bregoč	Zelengora
Клековача	Клековача	1 961	Klekovača	Klekovača
Црвањ	Зимомор	1 920	Zimomor	Crvanj
Јахорина	Огорјелица	1 916	Ogorjelica	Jahorina
Виторог	Велики Виторог	1 906	Veliki Vitorog	Vitorog
Бјеласница (Гатачка)	Бјеласница	1 867	Bjelasnica	Bjelasnica (Gatačka)
Баба	Ђед	1 735	Đed	Baba
Вучево	Жрвањ	1 696	Žrvanj	Vučevo
Романија	Велики Лупоглав	1 652	Veliki Lupoglav	Romanija
Требевић	Требевић	1 629	Trebević	Trebević
Јавор	Велики Жеп	1 537	Veliki Žep	Javor
Ситница планина	Кобилџача (Кобилџа глава)	1 529	Kobiljčača (Kobilja glava)	Sitnica planina
Голеш	Вучевица	1 491	Vučevica	Goleš
Димитор	Димитор	1 483	Dimitor	Dimitor
Лисина	Лисина	1 469	Lisina	Lisina
Бобија	Бобија	1 465	Bobija	Bobija
Деветак	Деветак	1 424	Devetak	Devetak
Ситница	Кобилџа глава	1 419	Kobilja glava	Sitnica
Очауш	Михиловац	1 402	Mihailovac	Očauš
Бјеласница (Требињска)	Мотка	1 395	Motka	Bjelasnica (Trebinjska)
Варда	Ресића Варда	1 388	Resića Varda	Varda
Шиша - гора	Шиша - гора	1 387	Šiša - gora	Šiša - gora
Срнетица	Миљакуша	1 379	Miljakuša	Srnetica
Вучја планина	Вучја планина	1 378	Vučja planina	Vučja planina
Чемерница	Голи вис	1 339	Goli vis	Čemernica
Видуша	Велики Тисац	1 328	Veliki Tisac	Viduša
Сљеменска планина	Сљеменска планина	1 307	Sljemenska planina	Sljemenska planina
Снијежница	Комолџ	1 263	Komolj	Sniježnica
Мањача	Велика Мањача	1 236	Velika Manjača	Manjača
Леотар	Леотар	1 227	Leotar	Leotar
Тисовац	Тисовац	1 173	Tisovac	Tisovac
Борја	Велика Руњавица	1 078	Velika Runjavica	Borja
Јаворник	Бандијерка	1 060	Bandijerka	Javornik
Узломац	Прдељица	1 002	Prdeljica	Uzlomac
Козара	Лисина	976	Lisina	Kozara
Осмача	Осмача	949	Osmaća	Osmaća
Озрен (Добојски)	Велика Остравица	918	Velika Ostravica	Ozren (Dobojski)
Глогова планина	Велики Дрењак	771	Veliki Drenjak	Glogova planina
Мотајица	Градина	652	Gradina	Motajica
Мајданска планина	Мајданска планина	618	Majdanska planina	Majdanska planina
Јаворова	Велики Коњушић	605	Veliki Konjušić	Javorova
Љубић	Свињар	594	Svinjar	Ljubić

¹⁾ Ороними и подаци за надморску висину преузети су са сета топографских карата Војногеографског института Београд
 Oronyms and data for the height above sea level taken from the set of topographic maps of the The Military Geographical Institute, Belgrade

Извор: Природно-математички факултет Бања Лука, Катедра за физичку географију
 Source: Faculty of Natural Sciences and Mathematics Banja Luka, Department for Physical Geography

2.5. Ријеке
Rivers

Ријеке	Дужина тока, km Length, km		Rivers
	укупно total	у Републици Српској in Republika Srpska	
Сава	945	202	Sava
Дрина	341	305	Drina
Лим	234	44	Lim
Прача	62,6	42	Prača
Дрињаџа	91,37	61	Drinjača
Босна	279,4	79	Bosna
Усора	25,99*	6,54*	Usora
Украина	80,9	80,9	Ukrina
Врбас	249,9	117	Vrbas
Врбања	95,4	95,4	Vrbanja
Плива	31,45	20	Pliva
Уна	212,5	82	Una
Сана	157,7	85	Sana
Гомјеница	68,5	68,5	Gomjenica
Требишњица	96,5	56	Trebišnjica
Неретва	225	39	Neretva

Извор: Агенција за воде обласног ријечног слива Сава, Бијељина
Source: Water Agency for Sava River District, Bijeljina

2.6. Јачи земљотреси, 1996–2010, са епицентрима на територији Републике Српске
Stronger earthquakes, 1996–2010, with epicenters on the territory of Republika Srpska

Мјесто – локација	Датум Date	Хипоцентрално вријеме ¹⁾ Hypocentral time	Географска ширина Latitude	Географска дужина Longitude	Магнитуда ²⁾ Magnitude	Интензитет ³⁾ Intensity	Place (location)
Боцац	20. 2. 1996.	14:12:13	44,50	17,23	4,7	6-7	Bočac
Бања Лука	12. 11. 1996.	11:32:30	44,90	17,40	3,8	5	Banja Luka
Бања Лука	11. 2. 1998.	4:26:50	44,79	17,55	3,8	5	Banja Luka
Теслић	26. 2. 1998.	12:09:20	44,72	17,71	4,1	5-6	Teslić
Невесинје	13. 3. 1998.	23:07:29	43,11	18,24	3,5	4-5	Nevesinje
Источни Дрвар	15. 4. 1998.	23:30:47	44,37	16,63	4,1	5-6	Istočni Drvar
Невесинје	16. 5. 1998.	10:55:13	43,48	18,15	3,9	5	Nevesinje
Невесинје	16. 5. 1998.	13:28:44	43,42	18,12	3,4	4-5	Nevesinje
Гацко	11. 5. 1999.	22:20:12	43,04	18,56	3,9	5	Gacko
Невесинје	1. 1. 2001.	19:12:21	43,30	18,12	3,8	5	Nevesinje
Масловаре	3. 5. 2001.	23:35:26	44,68	17,55	3,0	4	Maslovarе
Требиње	22. 7. 2001.	20:08:16	42,79	18,18	4,6	6-7	Trebinje
Бања Лука	14. 10. 2001.	16:51:16	45,01	17,23	3,7	5	Banja Luka
Љубинје	25. 11. 2001.	2:09:28	42,83	18,10	3,3	4-5	Ljubinje
Котор Варош	29. 3. 2002.	16:04:01	44,60	17,39	4,0	5-6	Kotor Varoš
Гацко	1. 5. 2002.	19:41:28	43,20	18,47	3,9	5	Gacko
Фоча	21. 1. 2003.	20:15:02	43,31	19,01	3,6	5	Foča
Гацко	8. 2. 2003.	11:11:24	43,10	18,51	3,6	5	Gacko
Шипово	2. 9. 2003.	19:17:48	44,28	17,03	3,9	5	Šipovo
Гацко	17. 9. 2003.	8:36:06	43,23	18,51	3,5	4-5	Gacko
Милићи	14. 12. 2003.	10:09:29	44,08	19,09	5,1	6-7	Milici
Сарајево	31. 3. 2004.	15:23:23	43,92	18,50	3,2	4-5	Sarajevo
Невесинје	21. 9. 2004.	4:46:09	43,18	18,13	4,2	5-6	Nevesinje
Невесинје	22. 1. 2005.	0:32:44	43,13	18,15	3,0	4	Nevesinje
Јахорина	11. 6. 2005.	11:51:48	43,38	18,83	3,4	4-5	Jahorina
Чемерно	16. 6. 2005.	13:42:47	43,26	18,56	3,5	4-5	Čemerno
Берковићи	27. 9. 2005.	0:25:34	43,22	18,15	5,1	6-7	Berkovići

2.6. Јачи земљотреси, 1996–2010, са епицентрима на територији Републике Српске
Stronger earthquakes, 1996–2010, with epicenters on the territory of Republika Srpska
 (наставак/continued)

Мјесто – локација	Датум Date	Хипоцентрално вријеме ¹⁾ Hypocentral time	Географска ширина Latitude	Географска дужина Longitude	Магнитуда ²⁾ Magnitude	Интензитет ³⁾ Intensity	Place (location)
Котор Варош	16. 3. 2006.	11:28:50	44,59	17,48	3,6	5	Kotor Varoš
Фоча	9. 6. 2006.	21:33:40	43,37	18,69	3,6	5	Foča
Фоча	9. 6. 2006.	23:13:12	43,40	18,65	3,9	5	Foča
Невесиње	17. 6. 2006.	17:07:49	43,41	18,03	3,8	5	Nevesinje
Невесиње	17. 6. 2006.	20:01:10	43,39	18,09	4,3	6	Nevesinje
Невесиње	17. 6. 2006.	20:09:26	43,36	18,15	4,2	5-6	Nevesinje
Сребреница	19. 7. 2006.	2:35:24	44,07	19,27	3,6	5	Srebrenica
Хан Пијесак	29. 1. 2007.	10:46:46	43,98	18,95	3,5	4-5	Han Pijesak
Козара	15. 8. 2007.	10:43:30	45,11	16,98	3,8	5	Kozara
Добој	16. 8. 2007.	2:51:45	44,74	17,92	3,6	5	Doboj
Прњавор	24. 11. 2007.	6:37:58	44,83	17,60	3,5	4-5	Prnjavor
Требиње	14. 11. 2008.	13:26:05	42,56	18,60	4,7	6-7	Trebinje
Берковићи	21.2.2009.	8:55:38	43,03	18,21	3,2	4-5	Berkovići
Пале	30.3.2009	13:27:18	43,77	18,58	3,7	5	Pale
Пале	31.3.2009.	1:46:03	43,84	18,54	4,1	5-6	Pale
Козара	7.5.2009.	12:11:06	45,07	17,04	3,8	5	Kozara
Горажде	30.8.2009.	23:33:18	43,62	19,07	3,3	4-5	Goražde
Рогатица	1.12.2009.	6:24:51	43,74	19,09	3,6	5	Rogatica
Волујак	18.1.2010.	23:51:33	43,26	18,67	3,4	4-5	Volujak
Рогатица	12.2.2010.	6:54:00	43,79	19,02	3,1	4-5	Rogatica
Рогатица	18.3.2010.	18:52:55	43,78	19,03	3,1	4-5	Rogatica
Рогатица	24.3.2010.	1:46:02	43,79	19,03	3,6	5	Rogatica
Рогатица	13.4.2010.	18:41:56	43,77	19,05	3,5	5	Rogatica
Зеленгора	10.6.2010.	6:16:02	43,43	18,59	3,6	5	Zelengora
Црвањ	17.6.2010.	5:23:17	43,43	18,20	3,1	4	Crvanj
Драгочај	10.8.2010.	6:52:49	44,89	17,19	3,2	4-5	Dragočaj
Зеленгора	12.11.2010	11:28:57	43,42	18,59	3,6	5	Zelengora

¹⁾ Вријеме потреса је дато по UTC времену (универзално вријеме)
Time of the earthquakes is presented in UTC (Universal Time Code)

²⁾ Магнитуда потреса је изражена у јединицама Рихтерове скале
Magnitude is given in Richter's scale

³⁾ Интензитет потреса у епицентралној зони одређен је према Меркали-Канкани-Зиберговој (Merkalli-Cancani-Sieberg) скали (°MCS).
Earthquake intensity at the epicentre is rated by MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) scale.

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.7. Годишње вриједности важнијих метеоролошких параметара и средња мјесечна температура ваздуха, 2010.
Annual values of main meteorological parameters and average monthly air temperature, 2010

Мјесто Settlement	Средња годишња температура ваздуха, °C Temperature, annual mean, °C	Средња мјесечна температура ваздуха, °C Temperature, monthly mean, °C												Облачност, десетине Cloudiness, tenths	Влажност, % Humidity, %	Инсолација, час Insolation, hours	Број дана Number of days				
		јан. Jan.	феб. Feb.	март March	април April	мај May	јун Jun	јул July	авг. Aug.	сеп. Sep.	окт. Oct.	нов. Nov.	дец. Dec.				грмљавина thunder	снијег snow	магла fog	мраз frost	киша rain
Бања Лука Banja Luka	11,6	0,2	2,4	7,5	12,0	16,5	20,4	23,1	21,8	15,7	9,4	8,9	1,5	6,5	78	1 636	35	59	81	73	188
Бијељина Bijeljina	11,9	0,1	2,3	7,2	12,4	17,3	20,6	23,3	22,6	16,2	9,4	9,6	1,3	6,4	81	...	30	51	60	70	176
Билећа Bileća	12,4	2,9	4,3	6,8	11,7	14,8	19,5	22,8	22,7	16,8	11,4	10,4	4,5	5,5	73	2 085	56	12	3	62	164
Вишеград Višegrad	11,2	1,2	2,0	6,4	11,5	15,4	19,5	22,2	22,3	15,6	9,4	8,2	1,0	7,2	76	...	18	39	72	73	181
Градишка Gradiška	11,9	0,4	2,0	7,7	13,0	17,1	20,9	23,9	22,5	16,0	9,6	9,0	1,2	5,9	75	42	44	69	152
Дервента Derventa	11,3	0,0	1,3	6,8	12,3	16,7	20,5	22,9	21,8	15,8	8,9	7,8	0,3	4,9	...	1 303	...	31	72	88	135
Добој Doboј	11,3	0,6	1,9	7,1	11,9	16,0	19,7	22,3	21,3	15,6	9,2	8,8	1,8	6,8	80	1 621	31	50	73	73	187
Дринић Drinic	8,3	-1,9	0,4	3,2	7,6	12,2	15,7	18,5	17,9	12,2	7,0	7,3	-0,6	35	79	25	99	177
Мркоњ. Град Mrkonj. Grad	9,4	-1,4	1,0	4,7	9,6	13,6	17,2	19,6	19,2	13,5	7,7	8,5	0,2	6,4	78	...	24	68	38	91	191
Нови Град Novi Grad	10,8	0,0	1,7	6,9	11,4	15,4	19,1	22,1	20,5	14,6	9,2	8,3	0,5	6,2	76	...	17	66	115	68	172
Приједор Prijedor	11,5	0,1	2,1	7,4	12,2	16,2	20,4	23,3	21,6	15,5	9,5	8,6	1,0	6,5	76	1 636	22	48	83	82	159
Рибник Ribnik	10,5	-0,2	1,7	5,9	10,5	14,6	18,2	20,5	20,0	14,6	9,1	9,8	1,7	6,1	79	...	25	61	157	84	198
Рудо Rudo	11,0	1,0	2,0	6,3	11,1	15,0	19,1	21,5	22,1	15,8	9,3	7,7	0,7	7,1	71	...	19	52	133	77	166
Соколац Sokolac	7,6	-2,5	-1,0	2,4	7,4	11,6	15,7	17,8	17,8	11,8	6,0	6,2	-1,5	6,4	79	1 628	27	81	80	132	186
Србац Srbac	10,4	0,0	1,2	6,4	10,4	14,0	18,6	22,1	20,7	14,5	8,3	7,3	0,7	...	75	...	16	40	107	74	182
Сребреница Srebrenica	10,9	0,4	2,2	6,1	11,2	14,7	18,4	20,9	20,2	15,0	9,1	10,0	2,5	6,7	81	...	13	67	104	91	183
Требиње Trebinje	14,4	5,1	6,3	8,4	13,8	16,5	21,0	24,8	24,9	18,8	13,7	12,6	6,7	4,9	63	...	63	-	-	24	167
Фоца Foča	10,7	1,6	2,0	5,8	11,0	14,3	18,0	20,8	20,9	15,3	9,5	7,8	1,1	6,8	20	34	36	91	157
Хан Пијесак Han Pijesak	6,8	-3,8	-1,6	1,1	6,3	10,7	14,7	17,1	16,9	11,2	5,1	5,9	-2,0	6,6	87	...	11	90	66	126	221
Чемерно Četerno	6,4	-3,3	-1,2	0,4	5,6	9,2	13,4	15,8	16,6	10,8	5,7	5,8	-1,5	6,1	84	1 730	27	119	51	107	205
Шипово Šipovo	10,5	0,4	1,4	5,9	10,9	14,6	18,2	20,5	20,4	14,6	9,0	9,1	1,2	...	81	...	7	41	29	97	195

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
Source: Republic Hydrometeorological Service

2.8. Мјесечна сума падавина, 2010.
Precipitation, monthly total, 2010

mm

Мјесто	Јануар <i>January</i>	Фебруар <i>February</i>	Март <i>March</i>	Април <i>April</i>	Мај <i>May</i>	Јуни <i>June</i>	Јули <i>July</i>	Август <i>August</i>	Септембар <i>September</i>	Октобар <i>October</i>	Новембар <i>November</i>	Децембар <i>December</i>	Settlement
Бања Лука	132,2	101,6	113,8	71,1	148,0	234,6	66,3	87,0	196,0	83,8	73,6	87,6	Banja Luka
Бијељина	106,0	66,3	76,4	84,1	85,8	196,6	65,4	99,0	78,6	62,2	48,0	55,3	Bijeljina
Билећа	286,3	425,6	181,8	125,1	252,5	127,7	37,6	52,5	148,5	200,9	497,1	362,6	Bileća
Вишеград	49,7	101,6	34,0	65,2	73,8	96,9	68,3	36,1	117,6	68,3	142,2	76,7	Višegrad
Градишка	85,2	103,3	72,9	69,2	98,8	200,6	66,1	38,2	133,7	34,2	78,3	56,5	Gradiška
Дервента	118,9	117,9	92,6	71,8	216,4	301,8	56,9	80,6	136,4	103,5	84,3	102,1	Derвента
Добој	128,7	76,2	81,7	81,6	131,3	372,4	96,1	58,6	96,9	68,6	55,7	87,0	Doboj
Дринић	174,8	99,6	135,8	99,5	148,6	150,0	84,0	57,1	159,4	90,1	252,5	201,2	Drinić
Мркоњић Град	173,6	75,3	70,5	102,3	99,9	223,1	39,5	53,8	113,5	70,4	121,2	149,0	Mrkonjić Grad
Нови Град	129,0	87,7	84,3	64,8	142,2	165,1	60,4	85,6	205,2	84,4	127,3	82,3	Novi Grad
Приједор	110,5	69,0	84,9	72,3	170,7	188,2	49,0	68,1	161,1	58,5	102,8	67,4	Prijedor
Рибник	178,8	102,8	84,0	106,4	102,9	191,9	74,9	48,9	124,3	74,4	145,9	131,7	Ribnik
Рудо	49,7	83,5	41,0	68,2	52,5	111,9	69,3	33,2	94,5	76,5	134,2	101,4	Rudo
Соколац	118,5	97,6	50,8	63,0	107,4	203,7	52,1	77,3	134,8	98,5	168,4	102,3	Sokolac
Србац	66,3	42,3	42,3	38,6	71,4	197,5	62,9	56,1	102,3	61,7	55,7	50,5	Srbac
Сребреница	73,4	111,5	71,3	77,7	148,8	217,8	100,7	95,6	141,0	98,3	76,7	76,1	Srebrenica
Требиње	344,4	387,7	189,9	91,8	237,4	200,3	4,1	41,6	107,2	253,7	519,1	357,2	Trebinje
Фоча	118,3	188,4	43,4	77,8	89,3	118,1	63,2	24,4	100,9	90,4	231,8	136,7	Foča
Хан Пијесак	144,5	108,8	72,2	110,6	181,4	282,7	84,5	80,5	156,2	97,3	192,5	121,2	Han Pijesak
Чемерно	328,9	331,5	161,8	180,3	191,2	146,3	41,4	11,6	230,8	176,1	490,4	395,8	Čemerno
Шипово	139,4	76,0	72,6	86,2	84,3	190,4	40,0	35,0	97,4	87,6	85,2	111,4	Šipovo

 Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.9. Просјечни годишњи водостај на ријекама
Mean annual rivers' water level

cm

Ријека – хидролошка станица	Кота нуле <i>Zero quota</i>	Просјечни годишњи водостај <i>Mean annual water level</i>										River – gauging station
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Босна – Добој	137,01	-13	-32	-70	-25	-15	-41	-63	-68	-51	-22	Bosna – Doboj
Врбања – Врбања	166,22	74	65	46	66	77	69	58	63	63	66	Vrbanja – Vrbanja
Врбас – Бања Лука	151,21	160	159	125	161	164	154	137	140	151	167	Vrbas – Banja Luka
Врбас – Делибашино Село	141,38	85	86	63	89	93	90	73	80	84	121	Vrbas – Delibašino Selo
Дрина – Фоча, низв.	383,98	90	124	118	98	101	97	148	Drina – Foča, downstr.
Сава – Градишка	85,39	251	257	104	280	275	234	159	196	191	374	Sava – Gradiška
Сава – Србац	82,81	253	254	100	406	427	387	299	333	325	509	Sava – Srbac
Сана – Доњи Рибник	265,37	96	74	77	72	79	77	110	Sana – Donji Ribnik
Сана – Приједор	129,68	87	107	57	100	97	91	68	76	76	123	Sana – Prijedor
Уна – Нови Град, низв.	116,06	31*	98	40	95	97	83	50	73	71	202	Una – Novi Grad, downstr.
Уна – Нови Град, узв.	116,09	...	115*	106	175	185	157	130	151	148	134	Una – Novi Grad, upstr.
Црна Ријека – Мркоњић Град	...	22	23	20	24	26	24	23	24	25	25	Crna Rijeka – Mrkonjić Grad

 Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.10. Водостај на ријекама, 2010.
Rivers' water level, 2010

cm

Ријека – хидролошка станица <i>River – gauging station</i>	Кота нуле <i>Zero quota</i>	Водостај ¹⁾ <i>Rivers water level¹⁾</i>	Јануар <i>January</i>	Фебруар <i>February</i>	Март <i>March</i>	Април <i>April</i>	Мај <i>May</i>	Јуни <i>June</i>	Јули <i>July</i>	Август <i>August</i>	Септембар <i>September</i>	Октобар <i>October</i>	Новембар <i>November</i>	Децембар <i>December</i>
Босна – Добој <i>Bosna – Doboј</i>	137,01	м	-68	-77	-20	-43	-83	-90	-104	-130	-131	-122	-113	-63
		Ø	60	5	17	-14	-12	65	-61	-115	-98	-87	-46	28
		М	385	275	122	46	162	420	48	-84	-40	-17	150	263
Врбања – Врбања <i>Vrbanja – Vrbanja</i>	166,22	м	36	33	53	46	38	41	38	30	30	37	41	51
		Ø	85	68	72	67	69	102	56	37	47	52	60	77
		М	217	203	113	158	289	527	98	53	127	107	102	155
Врбас – Бања Лука <i>Vrbas – Banja Luka</i>	151,21	м	98	96	109	118	92	103	91	88	87	93	92	106
		Ø	223	184	195	192	179	200	138	109	122	124	146	200
		М	432	354	288	266	284	372	253	237	196	199	276	317
Врбас – Делибашино Село <i>Vrbas – Delibašino Selo</i>	141,38	м	86	65	75	61	57	50	42	31	33	37	46	95
		Ø	196	150	153	152	126	169	90	49	59	66	92	154
		М	431	353	252	235	277	606	204	150	160	195	237	304
Дрина – Фоча, низв. <i>Drina – Foča, downstr.</i>	383,98	м	142	125	121	109	109	105	53	40	39	43	57	232
		Ø	202	180	162	153	120	127	87	63	86	69	183	349
		М	344	292	198	200	130	162	133	119	151	152	393	632
Сава – Градишка <i>Sava – Gradiška</i>	83,39	м	240	177	470	190	135	156	-8	-20	-8	198	178	580
		Ø	599	365	594	406	290	422	80	14	261	374	405	677
		М	770	690	720	564	572	678	420	55	620	590	645	724
Сава – Србац <i>Sava – Srbac</i>	82,81	м	382	320	590	352	280	305	150	115	122	338	320	709
		Ø	738	504	716	533	425	576	244	170	382	504	518	793
		М	917	817	840	667	697	847	572	222	703	697	722	848
Сана – Доњи Рибник <i>Sana – Donji Ribnik</i>	295,86	м	126	74	131	139	124	118	57	46	41	40	68	98
		Ø	91	144	151	157	138	140	80	55	60	68	103	131
		М	151	153	171	189	169	181	137	83	98	98	157	187
Сана – Приједор <i>Sana – Prijedor</i>	129,68	м	55	47	107	79	37	36	3	-5	-6	11	33	88
		Ø	207	154	177	143	108	163	36	14	82	62	129	196
		М	421	428	279	265	311	454	153	69	277	144	351	417
Уна – Нови Град, низв. <i>Una – Novi Grad, downstr.</i>	116,06	м	82	87	118	78	40	31	4	-13	-18	17	45	105
		Ø	246	174	185	156	120	149	35	9	82	70	156	225
		М	326	336	246	270	343	409	123	47	310	158	372	464
Уна – Нови Град, узв. <i>Una – Novi Grad, upstr.</i>	116,03	м	129	148	170	143	124	124	99	83	97	123	131	199
		Ø	293	234	229	208	188	203	113	101	165	162	234	301
		М	380	396	282	319	385	438	161	122	349	228	437	523
Црна Ријека – Мркоњић Град <i>Crna Rijeka – Mrkonjić Grad</i>	462,96	м	23	24	25	25	22	22	23	21	21	21	21	24
		Ø	29	28	27	27	25	28	24	22	22	22	24	27
		М	44	42	31	33	29	54	26	25	25	23	31	37

¹⁾ м = минимум, Ø = просјек, М = максимум
m = minimum, Ø = mean, M = maximum

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
Source: Republic Hydrometeorological Service

2.11. Удио киселих падавина на локацији Метеоролошка станица Бања Лука
Percentage of acid precipitation at the location of the Meteorological Station Banja Luka

	Процент анализираних узорака <i>Percentage of analysed samples</i>	Укупан број анализираних узорака <i>Total number of analysed samples</i>	Број киселих падавина <i>Number of acid precipitation</i>				% киселих падавина <i>% of acid precipitation</i>
			укупно <i>total</i>	врло киселе <i>high acidity</i> 3≤pH≤4	средње киселе <i>medium acidity</i> 4<pH≤5	благо киселе <i>low acidity</i> 5<pH≤5,6	
2005	82	129	8	-	-	8	6,20
2006	76	113	2	-	-	2	1,77
2007	83	122	1	-	-	1	0,82
2008	82	129	3	-	1	2	2,33
2009	80	131	2	-	-	2	1,53
2010	81	152	1	-	-	1	0,65

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service

2.12. Просјечне годишње вриједности полутаната у ваздуху на локацији Метеоролошка станица Бања Лука
Average annual values of air pollutants at the location of Meteorological Station Banja Luka

	SO ₂ μg/m ³	NO μg/m ³	NO ₂ μg/m ³	NO _x μg/m ³	CO mg/m ³	O ₃ μg/m ³	PM ₁₀ μg/m ³
2005	35,66	4,77	8,39	15,70	0,32
2006	24,53	19,57	28,5	58,95	0,84	46,67	91,35
2007	...*	16,65	27,77	53,29	0,65	46,83	66,56
2008	42,27	27,62	20,27	61,74	0,72	43,66	70,90
2009	11,79*	9,92*	8,84*	20,43*	0,76	42,18	71,10
2010	17,16	1,14	39,71	...

Извор: Републички хидрометеоролошки завод
 Source: Republic Hydrometeorological Service